丹参 ERF 转录因子 *SmERF1* 基因的表达 分析和亚细胞定位

吴文燕¹, 蒋喜红¹, 刘春生¹, 黄璐琦^{2*}, 申业^{2*}

(1. 北京中医药大学 中药学院, 北京 100029;

2. 中国中医科学院 中药资源中心, 北京 100070)

[摘要] 目的: 对前期已经克隆的丹参 *SmERF1* 基因进行聚类分析, 分析 *SmERF1* 基因在不同诱导子处理后不同时间的表达情况; 并对其亚细胞定位分析。方法: 利用 MEGA5 软件对 *SmERF1* 基因及拟南芥 ERF 基因家族进行聚类分析; 利用半定量 RT-PCR 方法, 分析 *SmERF1* 基因在不同诱导子处理后不同时间的表达情况; 将 *SmERF1* 与 *GFP* 融合, 在洋葱表皮瞬时表达, 以确定 *SmERF1* 蛋白表达部位。结果: 丹参 *SmERF1* 属于 ERF 家族第 VII 亚族; YE + Ag⁺ 诱导对 *SmERF1* 基因的表达没有影响, ABA 和 MeJA 可以抑制该基因的表达, 而水杨酸诱导会出现先抑制, 后随处理时间加长, *SmERF1* 基因表达又恢复; 亚细胞定位确定 *SmERF1* 基因在细胞核内特异表达。结论: *SmERF1* 是一个 AP2/ERF 转录因子, 属于 AP2/ERF 家族第 VII 亚族, 其表达受 ABA, SA, MeJA 等激素调节控制。

[关键词] 丹参; ERF 转录因子; 表达分析; 亚细胞定位

AP2/ERF (APETALA 2/ethylene-responsive element binding factor) 转录因子家族是一类大的植物特异的转录因子家族, 依据所含有的结构域不同将 AP2/ERF 转录因子分成 4 个主要的亚家族: AP2, RAV, ERF, DREB 亚家族^[1]。AP2 亚家族转录因子蛋白中包含 2 个 AP2/ERF 结构域, RAV 亚家族包含 1 个 AP2/ERF 结构域和 1 个 B3 结构域, ERF 亚家族和 DREB 亚家族包含 1 个 AP2/ERF 结构域^[2-3]。AP2/ERF 结构域是 AP2/ERF 转录因子家族最主要的特征, 它由 60~70 个氨基酸序列构成的 DNA 结合结构域^[4]。

AP2/ERF 转录因子家族在植物生长和发育过程中起重要的调控作用: AP2 亚家族参与调控植物的生长, 比如花的发育和胚芽的发育等; RAV 亚家族成员参与乙烯和油菜素甾醇等激素的应答; ERF 亚家族参与激素信号传导和新陈代谢调控; DREB 亚家族参与了植物对生物和非生物胁迫的响应等^[2]。报道表明 ERF 转录因子参与调控长春花中

长春花碱的生物合成^[5], 青蒿中的 2 个 AP2/ERF 家族成员分别调控了青蒿素生物合成中的 2 个关键酶 ADS 和 CYP71AV1 的表达^[6]。

本文在实验室前期克隆的一个丹参乙烯应答因子结合蛋白 *SmERF1* 基因的基础上^[7], 对已经克隆的丹参 *SmERF1* 基因进行聚类分析, 结果发现 *SmERF1* 属于 AP2/ERF 家族第 VII 亚族; 分析了 *SmERF1* 基因在不同诱导子处理中不同时间的表达情况, 其表达受 ABA, SA, MeJA 等激素调节控制; 将 *SmERF1* 与 *GFP* 融合, 在洋葱表皮瞬时表达, 并对其进行了亚细胞定位分析, 确定 *SmERF1* 在细胞核内特异表达, 进一步证实 *SmERF1* 是一个 AP2/ERF 转录因子, 初步明确 *SmERF1* 基因在丹参中的调控模式。

1 材料

1.1 丹参毛状根

利用发根农杆菌 ATCC15834 (由中国林业科学院邱有德研究员惠赠, 本实验保存) 感染丹参 (陕西商洛) 无菌植株的叶片获得 6, 7-V 液体培养基, 80 r·min⁻¹ 摇床黑暗培养扩繁。

1.2 菌种及载体

大肠杆菌 *Escherichia coli* DH 5 α 购自宝生物工程 (大连) 有限公司, pE3025 质粒由中国农业大学生物学院董江丽副教授惠赠。

[稿件编号] 20130219005

[基金项目] 国家“重大新药创制”科技重大专项 (2009ZX09301-005)

[通信作者] * 申业, Tel: (010) 64014411-2955, E-mail: shenyemooon@yahoo.com.cn; * 黄璐琦, Tel: (010) 64014411-2955, E-mail: huan-gluqi@263.net

1.3 试剂

RNA 提取试剂 Trizol (Cat. No. 15596-018) 购自 Invitrogen 公司; RevertAid H Minus Reverse Transcriptase 逆转录酶, RiboLock RNase Inhibitor 和 Oligod(T)₁₈ Primer, Taq DNA 聚合酶购自 Fermentas 公司; 胶回收试剂盒购自北京百泰克生物技术有限公司; T4 DNA 连接酶 (M0202S)、限制性内切酶 *Kpn* I, *EcoR* I 购自 NEB (纽英伦生物技术北京有限公司); 金粉和基因枪耗材均购自美国伯乐公司 (bio-rad); 其他化学试剂均购自国产或者进口分析纯试剂。

2 方法

2.1 丹参总 RNA 提取

以培养 19 d 的生长状态良好的丹参毛状根为材料, 用 Trizol 法提取总 RNA, 具体操作参照 Invitrogen 公司产品说明书, RNA 保存在 75% 乙醇, -80 °C 低温冰箱中备用。

2.2 *SmERF1* 基因在诱导子处理下的半定量表达分析

2.2.1 诱导子制备 酵母提取物 (yeast extract) 生物诱导子的制备: 取 25 g 酵母提取物溶于 125 mL 蒸馏水中, 加入 100 mL 无水乙醇, 置于 4 °C 冰箱静置 4 d, 倾去上清液, 胶状沉淀溶于 125 mL 蒸馏水中, 加入 500 mL 无水乙醇 2 次沉淀, 离心去上清, 沉淀溶于 100 mL 蒸馏水中, 121 °C 灭菌 20 min, 冷却后置于 4 °C 冰箱备用。银离子诱导子 (Ag^+): 取 5.096 9 g $AgNO_3$ 溶于 100 mL 蒸馏水中, 制备得 3 mmol · L⁻¹ 的 Ag^+ 。茉莉酸甲酯 (MeJA) 购自 Sigma 公司 (392707), 终浓度为 100 μmol · L⁻¹。脱落酸 (ABA), 母液浓度为 10 mmol · L⁻¹, 终浓度为 50 μmol · L⁻¹。水杨酸 (SA), 母液浓度为 10 mmol · L⁻¹, 终浓度为 100 μmol · L⁻¹。向培养 19 d 的丹参毛状根培养基 (含 50 mL 6, 7-V 液体培养基) 中分别加入诱导子: YE + Ag^+ 组合 (YE 2 mL, Ag^+ 66.7 μL), SA, ABA, MeJA 进行诱导处理, 每个处理 3 个重复, 置黑暗中播床培养, 分别于处理后 0, 2, 4, 8, 12, 24, 36 h 收获毛状根, 吸干水分后, 液氮速冻, 于 -80 °C 冰箱保存, 用于总 RNA 提取。

2.2.2 半定量表达分析 RT-PCR 反应体系: RNA 1 μg, Oligod(T)₁₈ 1 μL, RiboLock RNase Inhibitor 0.5 μL, 10 mmol · L⁻¹ dNTP 1 μL, RiboLock RNase Inhibitor 1 μL, 5 × Reaction buffer 5 μL。逆转录条

件: 42 °C 60 min; 65 °C 15 min。将合成双链 cDNA 放于 -20 °C 保存, 备用。PCR 扩增条件为: 95 °C 5 min; 95 °C 30 s, 50 °C 30 s, 72 °C 1 min, 共 40 个循环; 72 °C 10 min。

2.3 亚细胞定位

2.3.1 载体构建 根据 *SmERF1* 基因和载体 pE3025 的酶切位点分析, 选择 *Kpn* I 和 *EcoR* I 2 个限制性内切酶构建融合表达载体, 设计引物为: *SmERF1*-S-L: CGgaattcATGTGTGGTGGTTCAA tAATT TC, *SmERF1*-S-R: GGggtaccGGAAGAACACACTA TT-GTTTTG。引物在上海生物工程有限公司合成。分别将 *SmERF1* 基因和载体 pE3025 进行双酶切, 将酶切产物切胶回收, T4 DNA 连接酶 4 °C 连接过夜, 取 1 μL 连接产物转化大肠杆菌 DH5α, 菌液 PCR 阳性检验, 将阳性单克隆菌液测序。

2.3.2 质粒提取 取 50 mL 含有阳性重组质粒的菌液, 提取质粒, 用无菌水将其稀释至 1 g · L⁻¹, 以满足基因枪试验的要求。

2.3.3 子弹制作 向金粉中加入 0.05 mol · L⁻¹ 亚精胺 100 μL, 涡旋震荡, 超声 3 ~ 5 s 打碎金团, 加入 50 μL 重组质粒, 涡旋震荡 5 s, 中速涡旋下加入 1 mol · L⁻¹ CaCl₂ 100 μL, 室温沉淀 10 min, 离心去上清, 用 1 mL 无水乙醇洗涤 3 次, 3.5 mL PVP 溶液重悬。在无菌操作台上, 将制备台安装好, 打开氮气, 剪下约 75 cm 长管, 把混匀的金粉悬液迅速的导入至长管中, 放平长管, 放置 5 min, 将管中的液体导出, 打开氮气阀, 在旋转管子的同时 0.35 ~ 0.40 L PM 干燥管子, 待干燥充分后, 将管子切成约 1 cm 的子弹, 备用。

2.3.4 洋葱表皮 用刀片在切取洋葱内层表皮, 并用镊子小心的剥取内表皮 (大小约为 2 cm × 2 cm), 于 MS 固体培养基 (1% 琼脂, pH 为 5.8) 25 °C 培养过夜备用。

2.3.5 基因枪轰击 超净工作台中, 将子弹安装在基因枪的正确位置, 打开氮气, 在气压 160 Pa 条件下, 用基因枪对准培养好的洋葱表皮中部轰击, 将处理完的洋葱表皮放在新的 MS 培养基中 25 °C 培养过夜。

3 结果与分析

3.1 丹参 *SmERF1* 聚类分析

丹参 *SmERF1* 基因的 cDNA 编码由 231 个氨基酸组成的多肽, 相对分子质量约为 26.3 kDa, pI

质粒,用 *EcoR* I 和 *Kpn* I 内切酶进行双酶切验证,图显示有 2 个条带(图 4 中的 3),并且这 2 个条带分别与空载体双酶切和 PCR 产物双酶切结果大小一致,证明重组载体构建成功。

图 2. 质粒 pE3025 分别用 *EcoR* I 和 *Kpn* I 内切酶进行双酶切;3. 阳性菌液提取重组质粒,用 *EcoR* I 和 *Kpn* I 内切酶进行双酶切验证; M. maker。

图 4 重组质粒 pE3025-SmERF1 的双酶切鉴定

Fig. 4 The recombination plasmid of pE3025-SmERF1 was digested

3.3.2 结果观察 经基因枪转化的洋葱表皮在 25 °C 培养 24 h 左右后,将洋葱表皮制片,置于荧光显微镜下观察,见图 5。在蓝色激发光下,pE3025-GFP (空白载体对照)的荧光遍布于整个洋葱表皮细胞(图 5 中 b),而 *SmERF1*-GFP 融合蛋白的荧光信号非常强烈地集中在细胞核内,在细胞的其他位置没有分布(图 5 中 e)。同时,在亮视野下,可以清楚地观察到洋葱表皮的细胞轮廓(图 5 中 a,d),而将 2 种视野叠加后的图像可以很明显地看到 *SmERF1*-GFP 融合蛋白与空白对照的区别(图 5 中 c,f),通过上述的对比,可以判断出 *SmERF1*-GFP 融合蛋白只定位于细胞核内。

图 5 *SmERF1* 蛋白在洋葱表皮细胞的亚细胞定位分析

Fig. 5 Nuclear localization of the *SmERF1* protein in onion epidermal cells

4 讨论

AP2/ERF 转录因子家族主要调控植物的生长发育、繁殖、对激素的应答、以及对生物和非生物胁迫的适应过程等。由系统进化分析结果可知,*SmERF1* 基因属于 AP2/ERF 转录因子家族第 VII 亚族,这个亚族的特点是具有 1 个 MCGGAI 结构域,并且这个亚族的成员在它的 AP2/ERF 结构域的 5' 端都具有一个单独的内含子。第 VII 亚族是一个较小的亚族,它在拟南芥、葡萄、杨树、水稻中分别只有 5、3、6、15 个成员。第 VII 亚族在葡萄中参与了葡萄成熟的早期过程的调控,在拟南芥中参与了基因的转录后调控,其成员 AtEBP 与一个 bZIP 转录因子家族成员 OBF4 在体外相互作用^[2-3]。

诱导子诱导表达结果分析,*SmERF1* 基因在 YE + Ag⁺ 诱导子处理 36 h 内表达没有明显差异。从水杨酸(SA)诱导后表达结果来看,*SmERF1* 基因的表达在短时间内受到较大的抑制作用,到第 12 个小时基本没有表达,但在随后的时间里面,可能是由于水杨酸有效浓度的降低,*SmERF1* 基因的表达逐渐升高,并在 36 h 恢复正常,说明一定浓度的水杨酸可以抑制 *SmERF1* 基因的表达。从 ABA 诱导的结果来看,*SmERF1* 基因的表达也是逐步的下调,但与 SA 不同的是,它在第 36 小时依然保持非常低的水平,没有表现出恢复的迹象,可能是由于 ABA 抑制 *SmERF1* 基因表达所需的浓度较低。在 MeJA 处理组,*SmERF1* 基因在 24 h 内表达差异不是很明显,但在 24 h 后表达急剧下降,到 36 h 已经具有非常明显的差异,推测 MeJA 调控 *SmERF1* 基因的表达是通过间接的方式的,它通过影响 ABA 和 SA 的调控网络来进一步的调控 *SmERF1* 基因的表达,所以表现出调控的延迟性。

亚细胞定位结果显示,*SmERF1* 基因只在细胞核内特异性的表达,认为它在细胞核中参与调控基因的转录过程,即调控目标基因 mRNA 的合成。如果将 *SmERF1* 基因进行 RNAi 干扰和过表达分析,可以进一步确定 *SmERF1* 转录因子在丹参中的调控机制。

[参考文献]

- [1] J Mizoi, K Shinozaki, K Yamaguchi-Shinozaki. AP2/ERF family transcription factors in plant abiotic stress responses [J]. *BBA- Gene Regulatory Mechanisms*, 2012, 1819: 86.
- [2] Toshitsugu Nakano, Kaoru Suzuki, Tatsuhito Fujimura, et al. Genome-wide analysis of the ERF gene family in arabidopsis and rice

- [J]. *Plant Physiol*, 2006, 140: 411.
- [3] Federico M Giorgi, Sara Zenoni. Genomic and transcriptomic analysis of the AP2/ERF superfamily in *Vitis vinifera* [J]. *BMC Genomics*, 2010, 11: 719
- [4] Wessler S R. Homing into the origin of the AP2 DNA binding domain [J]. *Trends in Plant Sci*, 2005, 10: 54.
- [5] van der Fits L, Memelink J. ORCA3, a jasmonate-responsive transcriptional regulator of plant primary and secondary metabolism [J]. *Science*, 2000, 289: 295.
- [6] Yu Zongxia, Li Jianxu, Yang Changqing, et al. The jasmonate-responsive AP2/ERF transcription factor AaERF1 and AaERF2 positively regulate Artemisinin biosynthesis in *Artemisia annua* L [J]. *Mol Plant*, 2011, 5(2): 353.
- [7] 胥彬, 黄璐琦, 毛莹, 等. 丹参功能基因组研究IV——丹参乙烯应答因子(ERF)基因的分析 [J]. *中国中药杂志*, 2009, 34(19): 2564.
- [8] 王学勇, 崔光红, 黄璐琦, 等. 诱导子对丹参毛状根中丹参酮类成分积累影响 [J]. *中国中药杂志*, 2007, 32(10): 976.

Expression analysis and subcellular localization of an ERF transcription factor from *Salvia miltiorrhiza*

WU Wen-yan¹, JIANG Xi-hong¹, LIU Chun-sheng¹, HUANG Lu-qi^{2*}, SHEN Ye^{2*}

(1. School of traditional Chinese Medicine Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China;

2. National Resource Center for Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China)

[Abstract] **Objective:** A SmERF1 gene was isolated from *Salvia miltiorrhiza*, and expression patterns to different stress conditions were analysed in the root tissues of *S. miltiorrhiza*. **Method:** The cDNA of SmERF1 gene from *S. miltiorrhiza* was isolated by RT-PCR, and the phylogenetic tree using the neighbour-joining tree method in Mega 5 was obtained. To confirm the protein is likely to localize in the nucleus, the SmERF1 coding region was fused to the N-terminus of the GFP gene under the control of the CaMV 35S promoter and transferred into onion epidermal cells using the particle bombardment method. Semi-quantitative RT-PCR analysis revealed different expression pattern of SmERF1 gene in response to exogenous ABA, MeJA and SA. **Result:** The phylogenetic tree analysis revealed that SmERF1 is most similar to AP2/ERF VII subgroup members. The transient expression of the SmERF1::GFP fusion protein indicated that the SmERF1 was exclusively localized to the nucleus. The transcript of SmERF1 highly accumulated when the plants were treated with MeJA, while accumulated slightly in response to exogenous ABA, salicylic acid. **Conclusion:** These results suggest hormone such as ABA, MeJA and SA signaling pathways can be involved in the activation and inhibition of the SmERF1.

[Key words] *Salvia miltiorrhiza*; ERF; expression analysis; subcellular localization

doi: 10.4268/cjcm20130705

[责任编辑 吕冬梅]